

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER**Anusol 10 mg/280 mg Zäpfchen**

Lidocainhydrochlorid 10 mg

Zinkoxid 280 mg

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn Sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Anusol und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Anusol beachten?
3. Wie ist Anusol anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Anusol aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST ANUSOL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?Rektale Anwendung

Anusol gehört zur Gruppe der Arzneimittel gegen Hämorrhoiden und enthält zwei Wirkstoffe: Lidocain und Zinkoxid.

Symptomatische Behandlung ano-rektaler Erkrankungen wie: Hämorrhoiden, Risse und Juckreiz.

Wie immer bei Hämorrhoiden sollen Maßnahmen wie Hygiene, Verhindern von Verstopfung und, in einigen Fällen, eine Verödung der Hämorrhoiden bis zu einer Operation erwogen werden.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ANUSOL BEACHTEN?

Anusol darf nicht angewendet werden,

wenn Sie allergisch gegen Lidocain, Zinkoxid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Anusol für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei der Behandlung von Hämorrhoiden muss unbedingt auf eine gute Hygiene geachtet und Verstopfungen vermieden werden.
- Wenn nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie Ihren Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Reizung auftritt, wird empfohlen, die Behandlung mit Anusol abzusetzen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Anusol anwenden.

Anwendung von Anusol zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Anusol ist zur rektalen Anwendung bestimmt. Das Produkt sollte auf jeden Fall während der Schwangerschaft und Stillzeit mit Vorsicht angewendet werden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

3. WIE IST ANUSOL ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Anwendung bei Erwachsenen

Anusol Zäpfchen müssen in den After eingeführt werden.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die empfohlene Dosis ein Zäpfchen am Morgen, ein Zäpfchen am Abend sowie ein Zäpfchen nach jedem Stuhlgang. Nicht mehr als 6 Zäpfchen pro 24 Stunden anwenden.

Anwendung bei Kindern

Anusol wird bei Kindern nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Anusol angewendet haben, als Sie sollten

Eine längere hochdosierte Anwendung kann zu Symptomen einer Lidocain-Überdosierung führen. Die Behandlung muss dann sofort abgebrochen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Anusol haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Anusol vergessen haben

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, wenden Sie die nächste zum vorgesehenen Zeitpunkt an. Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Überempfindlichkeitsreaktionen sind selten. Bei besonders empfindlichen Patienten kann eine lokale Reizung auftreten.

Die Nebenwirkungen des Lidocains sind allgemeiner Art (durch übermäßige Resorption, die in diesem Fall aufgrund der niedrigen Konzentration nicht zu erwarten ist) z. B. Nervosität, Schwindel, Zittern, Schläfrigkeit, niedriger Blutdruck und langsamerer Herzschlag.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brüssel (www.fagg-afmps.be, patientinfo@fagg-afmps.be) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST ANUSOL AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 30°C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach ‚EXP‘ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Anusol enthält

- Die Wirkstoffe sind Lidocainhydrochlorid und Zinkoxid. Jedes Zäpfchen enthält 10 mg Lidocainhydrochlorid und 280 mg Zinkoxid.
- Die sonstigen Bestandteile sind feste halbsynthetische Glyceride.

Wie Anusol aussieht und Inhalt der Packung

Anusol Zäpfchen sind weiße Zäpfchen in einer PVC/PE Blisterpackung. Kartondose mit 18 Zäpfchen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse

Hersteller

Farnea, 10 Rue Bouché Thomas, ZAC sud d'Orgemont, 49007 Angers, Frankreich

Und

Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B- 2340 Beerse

Zulassungsnummer

BE 265185

Verkaufsabgrenzung Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im

Diese Gebrauchsgenehmigung wurde zuletzt genehmigt im 05/2016